

Οδηγίες χορήγησης αντικών φαρμάκων σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με νόσο COVID-19

Nirmatrelvir/Ritonavir (PAXLOVID[®], Pfizer)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Απαραίτητες προϋποθέσεις για την χορήγηση αντιικών φαρμάκων σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με νόσο COVID-19 (1/2)

- ❖ Θετικό Rapid Test ή PCR για SARS-CoV-2
- ❖ Πρώτες 5 ημέρες από την εμφάνιση συμπτωμάτων (η αίτηση υποβάλλεται εντός των 3 πρώτων ημερών)
- ❖ Απουσία κατάστασης κύησης ή θηλασμού
- ❖ Παρουσία παραγόντων κινδύνου για εξέλιξη σε σοβαρή νόσο



Απαραίτητες προϋποθέσεις για την χορήγηση αντιικών φαρμάκων σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με νόσο COVID-19 (2/2)

Παράγοντες κινδύνου για εξέλιξη σε σοβαρή νόσο θεωρούνται:

- Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων
- Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου
- Κυστική ίνωση
- Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία)
- Αιματολογικές κακοήθειες (ενεργός νόσος)
- Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες & 2-παθείς λόγω θεραπείας με Β-ειδικούς παράγοντες π.χ. Rituximab, υψηλές δόσεις και παρατεταμένη χορήγηση κορτικοειδών, βιολογικοί παράγοντες
- HIV με CD4<200 κύτταρα/μL
- Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ΠΡΟΣΟΧΗ : Μόνο για χορήγηση μολνουπιραβίρης (Lagevrio)
- Ηλικία ≥75 ετών

ή 2 ή περισσότεροι παράγοντες από τους κατωτέρω

- | | | | |
|-------------------|--|---|--|
| ○ Ηλικία ≥ 65 | ○ Χρόνια νεφρική νόσος (κάθαρση κρεατινίνης >30ml/min για να χορηγηθεί Paxlovid) | ○ Χρόνια καρδιαγγειακή νόσος (εγκεφαλικό, έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια, περιφερική αγγειοπάθεια, ανευρύσματα, ΑΥ υπό θεραπεία) | ○ Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία |
| ○ BMI ≥ 35 | ○ Χρόνια ηπατική νόσος | ○ Πνευμονική ίνωση | ○ Θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία |
| ○ ΣΔ υπό θεραπεία | | | |

